

Teste N.º 1

Matemática A

12.º Ano de Escolaridade

Nome do aluno: _____ N.º: ____ Turma: ____

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de calculadora.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado.

Na resposta aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Na resposta aos restantes itens, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias. Quando para um resultado não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

Formulário

Geometria

Comprimento de um arco de circunferência:

αr (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área de um polígono regular: Semiperímetro \times Apótema

Área de um setor circular:

$\frac{\alpha r^2}{2}$ (α – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro; r – raio)

Área lateral de um cone: $\pi r g$ (r – raio da base; g – geratriz)

Área de uma superfície esférica: $4 \pi r^2$ (r – raio)

Volume de uma pirâmide: $\frac{1}{3} \times$ Área da base \times Altura

Volume de um cone: $\frac{1}{3} \times$ Área da base \times Altura

Volume de uma esfera: $\frac{4}{3} \pi r^3$ (r – raio)

Progressões

Soma dos n primeiros termos de uma progressão (u_n):

Progressão aritmética: $\frac{u_1 + u_n}{2} \times n$

Progressão geométrica: $u_1 \times \frac{1 - r^n}{1 - r}$

Trigonometria

$\text{sen}(a + b) = \text{sen } a \cos b + \text{sen } b \cos a$

$\text{cos}(a + b) = \text{cos } a \cos b - \text{sen } a \text{sen } b$

Complexos

$(\rho e^{i\theta})^n = \rho^n e^{in\theta}$

$\sqrt[n]{\rho e^{i\theta}} = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}$ ($k \in \{0, \dots, n-1\}$ e $n \in \mathbb{N}$)

Regras de derivação

$(u + v)' = u' + v'$

$(u v)' = u' v + u v'$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - u v'}{v^2}$

$(u^n)' = n u^{n-1} u' (n \in \mathbb{R})$

$(\text{sen } u)' = u' \text{cos } u$

$(\text{cos } u)' = -u' \text{sen } u$

$(\text{tg } u)' = \frac{u'}{\text{cos}^2 u}$

$(e^u)' = u' e^u$

$(a^u)' = u' a^u \ln a$ ($a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$)

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$ ($a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$)

Limites notáveis

$\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ($n \in \mathbb{N}$)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty$ ($p \in \mathbb{R}$)

1. A turma X de uma determinada escola é constituída por 24 alunos, 12 rapazes e 12 raparigas.
- 1.1. Pretende-se formar uma comissão para organizar uma festa de *Halloween*. A comissão terá quatro elementos e terá de ser constituída por rapazes e por raparigas.
Quantas comissões diferentes se poderão formar?
- (A) ${}^{24}C_4 - {}^{12}C_4$
 (B) ${}^{24}C_4 - ({}^{12}C_4)^2$
 (C) ${}^{12}C_3 \times 12 \times 2 + ({}^{12}C_2)^2$
 (D) ${}^{12}C_3 \times 12 \times 2 + {}^{12}C_2 \times 2$
- 1.2. Considere agora que se pretende tirar uma fotografia com todos os elementos da turma X , colocados lado a lado. Os gémeos Pedro e Simão fazem parte da turma, mas não gostam de ficar juntos nas fotografias. Escreva uma expressão que dê o número de maneiras diferentes de o fazer, respeitando a vontade dos gémeos.
2. De uma determinada linha do triângulo de Pascal, sabe-se que o seu antepenúltimo elemento é 990. Quantos são os elementos dessa linha inferiores a 20 000?
 (A) 4 (B) 8 (C) 5 (D) 10
3. Considere todos os números de telefone da rede móvel que cumprem as seguintes condições:
- são constituídos por 9 algarismos;
 - começam por 91;
 - têm exatamente quatro algarismos 1;
 - têm exatamente três algarismos 5;
 - o número de telefone formado é um número múltiplo de 5.
- Quantos são esses números de telefone?
4. Na turma Y de uma determinada escola todos os alunos têm preferência por um dos três clubes de futebol da cidade. Sabe-se que 10 alunos preferem o clube A, n alunos preferem o clube B e m alunos preferem o clube C. Considere que se pretende colocar lado a lado todos os alunos desta turma.
Qual é a probabilidade de todos os alunos que preferem o clube B ficarem juntos, bem como ficarem juntos todos os alunos que preferem o clube C?
- (A) $\frac{n! \times m! \times 10!}{n! + m! + 10!}$ (B) $\frac{n! \times m! \times 11!}{(n + m + 10)!}$ (C) $\frac{n! \times m! \times 10! \times 3!}{n! + m! + 10!}$ (D) $\frac{n! \times m! \times 12!}{(n + m + 10)!}$

5. Considere, num plano, uma reta r e um ponto A exterior à reta. Assinala-se na reta um certo número n de pontos distintos. Sabe-se que, com o ponto A e com os pontos assinalados na reta r , é possível definir exatamente 156 vetores não nulos distintos. Determine o valor de n .

6. Um saco contém nove cartões, indistinguíveis ao tato, numerados de 1 a 9.

6.1. Colocam-se os nove cartões em cima de uma mesa, lado a lado, em linha reta.

Qual é a probabilidade de os cartões numerados com um número primo ficarem juntos?

(A) $\frac{1}{504}$

(B) $\frac{1}{126}$

(C) $\frac{5}{126}$

(D) $\frac{1}{21}$

6.2. Considere agora, além dos nove cartões numerados de 1 a 9, sete peças pretas indistinguíveis entre si.

Considere também, como indica a figura ao lado, um tabuleiro com 16 casas, dispostas em quatro filas horizontais (A, B, C e D) e em quatro filas verticais (1, 2, 3 e 4).

	1	2	3	4
A				
B				
C				
D				

Pretende-se dispor os nove cartões e as sete peças pretas no tabuleiro, de modo a ocupar todas as casas. Quantas configurações diferentes do tabuleiro se podem obter, de modo que as peças pretas se disponham apenas em duas filas horizontais e os cartões com um número par inscrito ocupem também uma fila horizontal?

7. Seja E o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset E$ e $B \subset E$). Sabe-se que:

- $P(A) = 0,5$
- $P(B) = 0,55$
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,2$

O valor da probabilidade condicionada $P(\bar{B}|(A \cup B))$ é igual a:

(A) $\frac{3}{16}$

(B) $\frac{5}{16}$

(C) $\frac{7}{16}$

(D) $\frac{9}{16}$

8. Numa determinada escola secundária, relativamente aos alunos de 12.º ano, sabe-se que:

- 40% dos alunos são rapazes;
- $\frac{2}{3}$ das raparigas estão inscritas em Biologia;
- $\frac{3}{7}$ dos alunos inscritos em Biologia são rapazes.

Escolhe-se, ao acaso, um aluno desta turma.

Determine a probabilidade de o aluno escolhido ser um rapaz que não está inscrito em Biologia.

Apresente o resultado na forma de percentagem.

9. Seja E o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória.

Sejam A e B dois acontecimentos ($A \subset E$ e $B \subset E$).

Sabe-se que A e B têm ambas probabilidade não nula.

Prove que:

$$P(\overline{A \cap B}) - P((\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cup B)) = P(A)(P(B|A) - 1)$$

10. Considere o desenvolvimento de $(\sqrt{x} + \frac{2a}{x})^8$, com $x > 0$ e $a \in \mathbb{R}^-$.

Sabendo que o coeficiente do termo em x é igual a 1008, determine o valor da constante a .

11. Considere, num plano α , duas retas estritamente paralelas r e s .

Assinalaram-se, na reta r , sete pontos distintos e, na reta s , um certo número n de pontos, igualmente distintos.

Escolhem-se, ao acaso, três dos pontos assinalados nas duas retas.

A probabilidade de esses três pontos definirem um triângulo é igual a:

$$\frac{7 \times {}^n C_2 + {}^7 C_2 \times n}{{}^{7+n} C_3}$$

Elabore uma composição na qual explique a expressão apresentada.

Na sua resposta:

- enuncie a regra de Laplace;
- explique o número de casos possíveis;
- explique o número de casos favoráveis.

FIM

COTAÇÕES

Item													
Cotação (em pontos)													
1.1.	1.2.	2.	3.	4.1.	4.2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	TOTAL
10	18	10	18	10	18	10	18	10	18	20	20	20	200

3.

$$\frac{9}{1 \times 1} \frac{1}{\times {}^6C_3} \frac{0}{\times 1} \quad \text{ou} \quad \frac{9}{1 \times 1} \frac{1}{\times {}^6C_3} \frac{5}{\times {}^3C_2} \frac{0}{\times 8}$$

6C_3 é o número de maneiras de escolher três posições, das seis disponíveis, para colocar os três algarismos 1 que faltam. Por cada uma destas maneiras, só existe uma forma de colocar os três algarismos 5.

6C_3 é o número de maneiras de escolher três posições, das seis disponíveis, para colocar os três algarismos 1 que faltam.

3C_2 é o número de maneiras de escolher duas posições, das três disponíveis, para colocar os dois algarismos 5 que faltam.

8 é o número de opções (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0) para colocar na posição que sobra.

$${}^6C_3 + {}^6C_3 \times {}^3C_2 \times 8 = 20 + 480 = 500$$

Assim, existem 500 números de telefone nas condições pretendidas.

4. Opção (D)

Número total de alunos: $10 + n + m$

Número de casos possíveis: $(10 + n + m)!$

Número de casos favoráveis: $n! \times m! \times 12!$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{10 \text{ alunos}} \underbrace{\hspace{5em}}_{n \text{ alunos}} \underbrace{\hspace{5em}}_{m \text{ alunos}} \times (10 + 1 + 1)!$$

($12!$ é o número de maneiras de permutar os 10 alunos que preferem o clube A, o bloco de alunos que preferem o clube B e o bloco de alunos que preferem o clube C, todos entre si.)

$$5. {}^nA_2 + 1 \times n \times 2 = 156 \Leftrightarrow n(n - 1) + 2n = 156$$

$$\Leftrightarrow n^2 - n + 2n - 156 = 0$$

$$\Leftrightarrow n^2 + n - 156 = 0$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \times 1 \times (-156)}}{2 \times 1}$$

$$\Leftrightarrow n = 12 \vee n = -13 \notin \text{IN}$$

Assim, $n = 12$.



6.

6.1. Opção (D)

Número de casos possíveis: 9!

Número de casos favoráveis: $4! \times 6!$

$$\frac{2 \ 3 \ 5 \ 7}{4!} \times \frac{\quad \quad \quad \quad}{6!}$$

A probabilidade pretendida é $\frac{4! \times 6!}{9!} = \frac{17\ 280}{362\ 880} = \frac{1}{21}$.

6.2. ${}^4C_2 \times 8 \times {}^2C_1 \times 4! \times 5! = 276\ 480$

- 4C_2 é o número de maneiras de escolher duas das quatro linhas horizontais onde vão ser colocadas as peças pretas;
- 8 é o número de maneiras de escolher, de entre os oito lugares das duas filas escolhidas para ficar com as sete peças pretas, o único lugar que não ficará ocupado por peças pretas;
- 2C_1 é o número de maneiras de escolher uma das duas filas restantes para se colocarem os cartões com um número par inscrito;
- $4!$ é o número de maneiras de permutar os quatro cartões com um número par inscrito na fila escolhida;
- $5!$ é o número de maneiras de permutar os cinco cartões com um número ímpar inscrito nos cinco lugares que restam.

7. Opção (B)

• $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,2 \Leftrightarrow P(\overline{A \cup B}) = 0,2 \Leftrightarrow 1 - P(A \cup B) = 0,2$
 $\Leftrightarrow P(A \cup B) = 0,8$

• $P(A \cup B) = 0,8 \Leftrightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,8$
 $\Leftrightarrow 0,5 + 0,55 - P(A \cap B) = 0,8$
 $\Leftrightarrow 0,25 = P(A \cap B)$

$$\begin{aligned} P(\overline{B} | (A \cup B)) &= \frac{P(\overline{B} \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P((\overline{B} \cap A) \cup (\overline{B} \cap B))}{P(A \cup B)} = \\ &= \frac{P((A \cap \overline{B}) \cup \emptyset)}{P(A \cup B)} = \\ &= \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(A \cup B)} = \\ &= \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \\ &= \frac{0,5 - 0,25}{0,8} = \end{aligned}$$



$$= \frac{0,25}{0,8} =$$

$$= \frac{5}{16}$$

8. Consideremos os seguintes acontecimentos:

A: “ser rapaz”

B: “estar inscrito em Biologia”

Sabemos que:

- $P(A) = 0,4$
- $P(\bar{A}) = 0,6$
- $P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow P(B \cap \bar{A}) = \frac{2}{3} \times \frac{6}{10}$
 $\Leftrightarrow P(B \cap \bar{A}) = \frac{2}{5}$
- $P(A|B) = \frac{3}{7} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{7} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)} = \frac{3}{7}$
 $\Leftrightarrow 7P(A \cap B) = 3(P(A \cap B) + 0,4)$
 $\Leftrightarrow 7P(A \cap B) = 3P(A \cap B) + 1,2$
 $\Leftrightarrow 4P(A \cap B) = 1,2$
 $\Leftrightarrow P(A \cap B) = 0,3$

Organizando os dados numa tabela:

	B	\bar{B}	Total
A	0,3	?	0,4
\bar{A}	$\frac{2}{5}$		0,6
Total			1

$$P(A \cap \bar{B}) = 0,4 - 0,3 = 0,1; 10\%$$

Logo, a probabilidade pedida é igual a 10%.

$$9. P(\overline{A \cap \bar{B}}) - P((\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cup B)) = P(\bar{A} \cup B) - P((\bar{A} \cup B) \cup (A \cup B)) =$$

$$= P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) - P(E) =$$

$$= 1 - P(A) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) - 1 =$$

$$= -P(A) + P(B) - (P(B) - P(A \cap B)) =$$

$$= -P(A) + P(B) - P(B) + P(A \cap B) =$$

$$= -P(A) + P(A \cap B) =$$

$$\begin{aligned}
&= P(A) \left(-1 + \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \right) = \\
&= P(A)(P(B|A) - 1) \quad \text{c.q.d.}
\end{aligned}$$

10. O termo geral deste desenvolvimento é:

$$\begin{aligned}
{}^8C_k (\sqrt{x})^{8-k} \times \left(\frac{2a}{x}\right)^k &= {}^8C_k x^{4-\frac{k}{2}} \times 2^k \times a^k \times x^{-k} = \\
&= {}^8C_k x^{4-\frac{3k}{2}} \times 2^k \times a^k \\
&= {}^8C_k 2^k \times a^k \times x^{4-\frac{3k}{2}}, \text{ com } k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}
\end{aligned}$$

$$4 - \frac{3k}{2} = 1 \Leftrightarrow 3 = \frac{3k}{2} \Leftrightarrow k = 2$$

O coeficiente do termo em x é ${}^8C_2 \times 2^2 \times a^2$. Logo:

$${}^8C_2 \times 4a^2 = 1008 \Leftrightarrow 112a^2 = 1008 \Leftrightarrow a^2 = 9 \Leftrightarrow a = \pm 3$$

Como $a \in \mathbb{R}^-$, então $a = -3$.

11. Sabemos que existem sete pontos distintos assinalados na reta r e n pontos distintos assinalados na reta s .

${}^{7+n}C_3$ é o número de maneiras de escolher quaisquer três pontos (sem que a ordem interesse) de entre os $7 + n$ pontos assinalados nas duas retas. Logo, o número de casos possíveis é ${}^{7+n}C_3$.

Existem duas hipóteses mutuamente exclusivas para definir um triângulo com os três pontos escolhidos: ou se escolhe um ponto da reta r e dois pontos da reta s ou se escolhem dois pontos da reta r e um ponto da reta s .

Para o primeiro caso, existem 7 modos distintos de escolher um ponto da reta r e, por cada uma destes modos, existem nC_2 maneiras distintas de escolher dois pontos da reta s (sem que a ordem interesse).

Para o segundo caso, existem 7C_2 modos distintos de escolher dois pontos da reta r (sem que a ordem interesse) e, por cada um destes modos, existem n maneiras distintas de escolher um ponto da reta s .

Logo, o número de casos favoráveis é $7 \times {}^nC_2 + {}^7C_2 \times n$.

Segundo a regra de Laplace, a probabilidade de um acontecimento é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis a esse acontecimento e o número de casos possíveis, quando estes são todos equiprováveis e em número finito. Logo, a probabilidade pedida é igual a:

$$\frac{7 \times {}^nC_2 + {}^7C_2 \times n}{{}^{7+n}C_3}$$

